

## Antinukleárne protilátky v izotype IgG

Test je určený na diagnostiku sporných, hraničných a nejasných výsledkov ANA nepriamou imunofluorescenciou. Slúži k potvrdeniu prítomnosti protilátok proti týmto antigénom:

Autoprotilátka	Autoimunitné ochorenie
Mi-2	Dermatomyozitída u detí a dospelých, Idiopatická myozitída
Ku	Systémový lupus erythematosus, Systémová skleróza, Myozitída
nRNP/Sm	Zmiešaná choroba spojiva (MCTD)
Sm	Systémový lupus erythematosus
SS-A	Systémový lupus erythematosus, Sjögrenov syndróm, Neonatálny lupus erythematosus
Ro-52	Systémový lupus erythematosus, Sjögrenov syndróm, Systémová skleróza, Idiopatická zápalová myopatia
SS-B	Systémový lupus erythematosus, Sjögrenov syndróm Neonatálny lupus erythematosus
Sc1-70	Systémová skleróza
PM-Sc1100	Polymyozitída, Systémová skleróza
Jo-1	Dermatomyozitída a polymyozitída
CENP B	Primárna biliárna cirhóza, Systémová skleróza
PCNA	Systémový lupus erythematosus
dsDNA	Systémový lupus erythematosus
Nukleozómy	Systémový lupus erythematosus
Históny	Systémový lupus erythematosus indukovaný liekmi, Reumatoidná artritída
ribozomálny P proteín	Systémový lupus erythematosus
AMA-M2	Primárna biliárna cirhóza, Systémová skleróza, chronická choroba pečene

**Materiál:** venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu

**Prístroj:** Dynablot 44

**Frekvencia vyšetrenia:** 1x za týždeň

**Poznámka:** Vyplniť fiadanku na imunológiu, označiť krížikom príslušné parametre:  
S\_ANA - profil

**Indikácie:** pri pozitívnych fluorescenčných obrazoch ANA

### Interpretácia výsledkov:

hodnotenie výsledkov ANA profilu je semikvantitatívne: pozit (+, ++, +++), negatívny nález je v norme

### Vysvetlivky skratiek:

ANA - antinukleárne protilátky