

Vážená pani doktorka / vážený pán doktor,

Na základe viacerých dotazov od lekárov, si Vám dovoľujeme zaslať interpretáciu výsledkov vyšetrenia z krvi na protilátky COVID 19:

Naša spoločnosť ponúka v rámci vyšetrovania protilátok z krvi dve triedy:

- Stanovenie IgG protilátok proti RBD (Receptor-binding domain), podjednotke proteínu Spike S1, vírusu SARS-CoV-2 (COVID-19) v ľudskom sére alebo plazme
- Stanovenie IgG protilátok proti NP (Nucleocapsidový proteín) v ľudskom sére alebo plazme.
- Stanovenie IgM protilátok proti RBD (Receptor-binding domain), podjednotke proteínu Spike S1, vírusu SARS-CoV-2 (COVID-19) v ľudskom sére alebo plazme
- Stanovenie IgM protilátok proti NP (Nucleocapsidový proteín) v ľudskom sére alebo plazme.

Interpretácia prítomnosti protilátok:

Stanovenie IgG protilátok proti RBD (Receptor-binding domain) - Hladina protilátok informuje o prekonaní ochorenia - pre sledovanie imunitnej odpovedi po pozitívnej PCR reakcii; a o tvorbe protilátok po vakcinácií SARS-CoV-2. Vyšetrenie protilátok je vhodná od 2 do 4 týždňov po infekcií.

Stanovenie IgG protilátok proti NP (Nucleocapsidový proteín) – Hladina protilátok informuje o prekonaní ochorenia SARS-CoV-2. Vyšetrenie protilátok je vhodná od 2 do 4 týždňov po infekcií.

Stanovenie IgM protilátok – informuje o akútnej fáze ochorenia SARS-CoV-2 (tvorí sa 7. – 10. deň po kontakte s infekčným agensom.

V prípade akýchkoľvek dotazov prosím neváhajte kontaktovať oddelenie mikrobiológie v ML Žilina, mobil: 0918 423 234, mail: serologia@klinickabiochemia.sk.